



PRECAUTIONS GOUTTELETTES + CONTACT DE HAUT NIVEAU

MISE EN PLACE

Sur prescription médicale dès suspicion du diagnostic

CHAMBRE

Individuelle, portes fermées, ou **regroupement de cas confirmés** dans la même chambre
Si disponible, privilégier **une chambre avec sas** pour faciliter le respect des mesures.



PATIENT ET VISITEURS AUTORISES :

SOIGNANTS :

MASQUES

- ⇒ Patient
- ⇒ Soignant
- ⇒ Visiteurs



Masque de soins

- ▶ dès la suspicion
- ▶ pour le patient hospitalisé, à porter pour toute sortie hors de sa chambre



Masque de soins


- ▶ mis en place et retiré **à l'extérieur de la chambre**
- ▶ remplacé par un **masque FFP pour les tous les actes à risque de production d'aérosols** (intubation, extubation, VNI, trachéotomie, ventilation artificielle par insufflation manuelle au BAVU, fibroscopie, aspiration, kiné respiratoire, Optiflow®, prélèvement nasal...).
- ▶ **+ lunettes de protection dans les 2 cas**

Les masques sont éliminés en **DASRI** (sac jaune)

SITUATION A RISQUE

Patient intubé-ventilé :

- ▶ Port systématique d'un **masque FFP et de lunettes de protection par les soignants**
- ▶ Pour l'aspiration trachéale : utiliser un **système clos**, car des projections de liquides de condensation au moment de l'ouverture de la voie et des déconnexions ne sont pas rares.



HYGIENE MAINS

Friction avec une solution hydro-alcoolique

TENUE DE PROTECTION

- ▶ Port d'une **surblouse à manches longues** à usage unique non stérile dès l'entrée en chambre. **Le SAMU** peut être amené à porter en intervention une combinaison intégrale.
- ▶ Port de **gants à usage unique** non stériles à manchettes courtes **dès l'entrée en chambre**
- ▶ Port systématique de **lunettes de protection**
- ▶ Port d'une charlotte



Voir vidéo d'habillage et déshabillage complet sur le site de l'EOH : <http://hux54:4080/declic/pages/eoh/microOrgEm.html>

VISITES

Visites exclues, sauf autorisation médicale expresse

MATERIEL

Dédié ou à usage unique

Matériel réutilisable à entretenir avec Oxyfloor, Ultrasol, ou produit compatible équivalent validé par l'EOH




Matériel dédié





VAISSELLE

Usage unique

Plateau repas reste en dehors de la chambre





LINGE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ne pas secouer les draps, ne pas prendre le linge contre sa tenue ▶ Privilégier le linge à usage unique, à éliminer dans les DASRI. ▶ Pour le linge réutilisable, suivre les recommandations de la blanchisserie des HUS : à ce jour, mise en quarantaine dans le service pendant 24h dans un sac en plastique fermé avant envoi. ▶ Noter sur le sac le numéro d'UF et la date de mise en sac.
DECHETS	<p>Elimination de tous les déchets en DASRI</p> 
EXCRETAS	<p>Le patient ne doit pas partager les toilettes communes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Toilettes individuelles ▶ A défaut, bassin ou chaise percée avec sac DASRI garni de feuilles de cellulose, ou autre dispositif adapté validé par l'EOH, à éliminer en DASRI ▶ Pas de traitement des urines ni des selles  <p style="text-align: center;">Individuel</p>
TRANSPORT POUR EXAMENS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A limiter au strict nécessaire. ▶ Information orale  et écrite des structures d'aval et des brancardiers ▶ Masque de soins pour le patient ▶ Friction des mains du patient avant de quitter sa chambre ▶ Placer le dossier dans un sac plastique transparent ▶ Eviter le passage en salle d'attente 
ENTRETIEN DE LA CHAMBRE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chambre à traiter en fin de tournée ▶ Bionettoyage quotidien <ul style="list-style-type: none"> ○ en 1 temps avec Oxyfloor ou Ultrazol (ou produit équivalent validé par l'EOH) ou ○ en 3 temps : 1) déterSION, 2) rinçage, 3) désinfection (chlore 0,5% ca : 3 pastilles / L) ▶ Privilégier l'utilisation de chiffonnettes et bandeaux à usage unique ▶ Renforcer le bionettoyage des surfaces fréquemment manipulées : au moins 2 fois par jour
ECHANTILLONS BIOLOGIQUES	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Limiter les prélèvements aux examens nécessaires ▶ Suivre les consignes des laboratoires ▶ Désinfecter l'extérieur des tubes de prélèvement avec une solution d'eau de Javel à 0,5% ca ou de l'alcool modifié à 70° ▶ Emballer les échantillons destinés aux laboratoires de microbiologie (dont Virologie) dans un emballage renforcé (2 sachets) ▶ Ne pas utiliser de valisette automatique ni de pneumatique pour l'acheminement au laboratoire des prélèvements respiratoires ou des selles
AU DEPART DU PATIENT	<ul style="list-style-type: none"> ▶ En cas de geste à risque élevé de production d'aérosol (<i>intubation, extubation, VNI, trachéotomie, ventilation artificielle par insufflation manuelle au BAVU, bronchoscopie</i>), en l'absence de système complémentaire de traitement de l'air validé par l'EOH (type Plasmair) ou de possibilité d'aérer la pièce, condamner la pièce 3 heures portes fermées avant accueil d'un patient indemne. ▶ Pendant ces 3 heures : port d'un masque FFP pour toute personne entrant dans la chambre.
LEVEE	<p>Sur prescription médicale, selon consignes communiquées par les médecins infectiologues.</p>

Ces mesures sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et des nouvelles données disponibles.